




# Eutergesundheitsmonitoring

## Erstlaktierendenmastitisrate

- Die Häufigkeit von Euterentzündungen bei Erstlaktierenden nimmt zu. Häufig wird die Erkrankung erst beim Anmelken oder in den ersten Wochen der Laktation bemerkt, obwohl die Infektion schon länger besteht.

Die Eutergesundheit von Erstlaktierenden ist häufig schon beim Anmelken gestört.



### Erstlaktierendenmastitisrate

$$\text{Erstlaktierendenmastitisrate [\%]} = \frac{a}{b} \times 100$$

**a** = Anzahl der Erstlaktierenden, die in ihrer 1. MLP > 100.000 Zellen/ml aufweisen

**b** = Anzahl aller Erstlaktierenden

### INFO

#### Maßnahmen zur Minimierung der Erstlaktierendenmastitisrate

- hygienischere Haltungsbedingungen
- kürzere Nachstreuintervalle
- erfolgreiche Fliegenbekämpfung
- Trennung von Trockenstehern und tragenden Rindern
- Vermeidung von Überbelegung
- Entfernen von ansaugenden Tieren
- Auch das Anmelken von Tieren vor der ersten Kalbung, wenn sie bereits die Milch laufen lassen, kann zu einer Verringerung der Erstlaktierendenmastitisrate führen!

### MERKE

#### Erstlaktierendenmastitisrate auf Betriebsebene:

Spitzenbetrieb: <15 %  
 durchschnittlicher Betrieb: 40 %